

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷七十九

詳校官太醫院院使臣張聲基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣倉聖脈

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣王貽桂

欽定四庫全書

普濟方卷七十九

明 周王朱橚 撰

眼目門

內障眼

論

凡病眼不痛不痒端然漸漸昏暗遂至失明眼狀雖如尋常瞳人中潛生障翳作青白色漸不辨人物微見三光名曰內障也多從一眼先患久後相牽俱成此狀若不預服湯丸除其本根必至為翳在內肉脉相連雙目

俱損此皆熱風衝腦腦脂流下灌睛亦有黑水凝結而作障也若忽然而暗經三五十日醫成者則是腦脂流下所致若三五百日之內漸漸眊眊者即是黑水凝結所成纔覺急療治驅其疾勢不爾昏昧障瞖內成非草石療之見功惟金鍼撥之乃效 內障眼凝結數重異象多般有浮有沈或滑或澀或形如皓雪或狀似清水或散若梨花或半分片月風攝明覈熱攻瞖開鐵角無垣斜喎有異或瞖嫩難見或瞖老黏睛向陽色之不通

背日閃之不動更有蒼黃非等灰色殊形異如斯之類
窮論莫盡其中亦有不可治者初患之時腦痛眼疼又
有雖不疼痛霍之不動者名曰死腎其腎作黃赤色不
可治也又有腎狀或作破散或深或淺中心密布濃厚
者亦不可治也凡學針開必須審細辨其証候明其淺
深脫或不曉病原未達機要妄行針藥遂致損傷深可
戒也 圓腎內障此眼初患之時眼前多見蠅飛花發
垂蟻薄烟輕霧漸漸加重不痛不痒端然漸漸不明眼

與不患眼相似不辨人物惟覩三光患者不覺先從一

眼先患向後相牽俱損此腦脂流下風腫上衝醫青白

瞳人端正陽看則小陰看則大其眼須針然後眼藥補

治用防風散羚羊角飲子

諺曰醫中最好是團圓一點然如水上盤陽裏看時應自

小陰中見則又還寬金針一撥蠅飛去朗日舒光五月天不是醫人誇巧妙難提遠地密相傳

水腎

內障此眼初患之時頭旋額角偏痛連眼臉骨及鼻頰

骨痛眼內赤澀有花或黑或白或紅皆因肝臟積熱肺

受風勞或心煩或吐大腸秘澀夜見燈光如蜂初患之

時宜令針治諸血脉忌督脉處出血過多恐加昏重宜

令服食還睛丸

歌曰水腎猶如水凍堅陰中陽裏一般般傍觀瞳人透表白針下分明是誰言

來往用針三五撥志心服藥必能痊若遇痛腎強撥下瞳人淨洗不能觀

滑腎內障此眼

初患之時不痒不痛還從一眼先患後乃相牽俱損端

然漸漸失明皆因腦脂流下肝風衝上瞳人內有腎如

水銀珠子不辨人物遂使然也宜令金針撥之將息後

服補肝湯石決明丸即瘥

歌曰滑腎看時心且專微含黃色白翩翩才開速大還速

小有似水銀珠子旋針撥雖然隨手落凝神針出却歸源縮針穿破青延散五月金烏照遠天

澀腎

內障此眼初患之時朦朧如輕烟薄霧漸漸失明還從
一眼先患後乃相牽俱損猶辨三光腎如凝脂色瞳人
端正狀宜令金針針之然後宜服還睛散九寶丸立効

歌曰澀腎隨開聚瞻遲陰陽大小亦些微傍觀瞳子凝
脂色先哲留言不用疑此障撥時依本法用針三五下
還離牢封七日圓瘡散腎內障此眼初患之時不痒
可將息應當莫自欺

不痛漸漸失明還從一眼先患惟瞳人裏有障腎作青
作白不辨人事猶見三光此眼宜令金針撥之然後宜
服還睛散補肝散湯治之即瘥

歌曰散腎內障又何為
形狀如酥點綴之一隨

針了和延散未得分明自覺知封畏安存須苦巧莫令
患者致狐疑殷勤遣服還睛散再覩三光百日期忌慎
一如僧戒行不須恣意縱貪痴深
言向說何為切忌取冥冥萬暗時

浮腎內障此眼初

患之時都無痒痛還從一眼先患後乃相牽俱損此狀

皆因腦中熱風衝入腦中腦脂流下凝結作翳如銀釘

色雖不辨人物猶見三光宜令金針撥之然後宜服決

明散墜腎丸立效

歌曰浮腎正觀如透外乍看色白似銀釘陰寬陽小隨開合此則深知是

本形辨認既能無錯繆金針撥出近烏
睛但依教法施心力免觸凝脂破不明

沈腎障眼此

眼初患之時肝臟勞熱還從一眼先患或見黑花後即

相牽俱損腦中熱氣流下要辨三光宜令金針撥之然

後服羚羊角飲子空青丸效

謂曰一般內腎又名沈隱
隱藏形黑水深向日細看

方得見自古相傳不是今此障撥時須遠見勸君
先用短頭針墜腎強過五十息只圖牢固沒他心

橫

腎內障此眼初患之時還從一眼先患皆是五臟虛勞

毒風腫上腦脂流下令眼失明猶辨三光宜用金針撥

之宜服還睛丸七寶散瘥

歌曰惟有橫關內障醫家挑
掛最宜知細看橫心如劍脊上

頭下畔薄微微開時先向中心撥隨手還應
若霧披改往修來何所作一生志行願歸依

偃月腎

內障此眼初患之時微有頭旋額角痛亦因肝氣不足

及熱風衝入致使生翳如偃月之狀還用金針撥之然

後宜服通明散墜翳丸立效

歌曰眼中一種腦脂凝何得偏稱偃月名一畔厚而

一畔薄翳工不可即疑生欲知巧妙行醫法厚處先宜撥便明丸散還睛應遣服堅牢百歲得安寧

棗

花翳內障此眼初患之時微有頭旋眼澀漸漸昏暗眼

中時時痒痛腦熱有花黃黑不定此狀宜令針治諸穴

然後宜服還睛散墜翳丸立效

歌曰翳中何名是棗花週迴鋸齒沒諸他撥時

從上輕輕撥狀似流星落遠霞細意便看瞳子內莫流斷却作攔遮依前不斷還睛藥百歲光明觀物華

白翳黃心內障此眼初患之時肝藏勞熱皆從一眼先

患後乃相牽俱損初覺急治即瘥先須憑服湯藥丸散

將息即宜針刺諸穴後更宜金針輕撥之然後服墜腎

散即效

歌曰可憐白腎使黃心患者商量懼具針來往用針三五撥不隨針落藥能沈還睛方術須通

秘百日如風捲霧陰期苦丁寧須向說窺看神效直千金

黑水凝腎內障此眼初

患之時不痒不痛微有頭旋眼澀見花黃黑不定瞳人

微有大賢或青白宜用金針輕撥之然後宜服蘆薈丸

通明散立效

歌曰黑腎水結凝青色可憐內障沒真容陰陽開處難開聚如覺風疔在膽中還用

金針三五撥藥憑蘆薈作神功期成百日丁寧說玉兔中秋照遠空

驚振內障此眼初

患之時忽因五臟虛勞受疾亦由肝氣不足熱毒衝於腦中即或因打築著腦惡血流下漸入眼內後經三五年間變成白翳一如內障形狀不宜針撥先患之眼更一隻牽損之眼却待翳成依法針之立效然後服鎮肝丸還睛散即效

歌曰或然撞振不全傷疼痛微微目下長便即腦脂為白色一如內障觀三光

不須錯悞將針撥却恐為災難可當在後若牽非損者翳元如法始開張

混睛外障眼初

患之時先痛後痒礮澀淚出怕日羞明白睛先赤發歇作時無定准漸漸眼內赤脉橫立遮精如隔絹看物難

辨此是毒風在肝藏積血在臉背之間致使然也初覺

患宜令鎌洗鉤割腎膜熨烙去除根本然後宜服涼肝

散點七寶膏服退腎丸

歌曰白精先赤作根基痛痒風吹淚出眇矜澀難開旬日內發

無定准有抽時年深漸變睛為碧滿目凝脂始覺之赤脉如絲橫與豎混睛外障莫狐疑毒風赤血成其暈如此誰言易可醫冷澀藥中須得妙點摩腎膜盡為期頻兼雙臉同施毘風熱平時即住之湯藥稍和年歲服要除根本莫嫌遲內障眼根源歌曰不痒不痛漸昏朦薄霧輕烟漸漸濃或見蠅飛花亂出或如懸喜在虛空此般狀樣因何得肝臟停留熱及風大叫大啼驚與怒腦脂流入黑暗中初時一眼先昏暗次第相牽與一同苦口何須陳逆耳只原肝氣不相通此時眼藥期先定將息多乖即沒功日久既應全暗黑時名內障障雙腫

名字隨形分十六龍師聖者會推窮靈藥這回難得效
金針一撥日當空強將修息依言說莫遣依前說復同

凡內障之眼形候甚多好惡非一有水有澀有滑有散水
者撥之不下滑者閉之不牢澀者收之稍遲散者刮之
難聚如此之類宜鑒辨之或浮或深或老或嫩用針輕
重粗細則量宜淺宜深宜遲宜疾患人或冷或熱或實
或虛若熱多者宜先服涼藥令熱毒先除方始開之不
爾恐氣開吐逆若有風虛者先宜以祛風鎮心之藥候
四體平和方宜下針不爾暈悶驚悸切在臨時消息隨

其虛實所宜也又性熱者腦脂流下其腎易老性冷者其腎難老老障者可用小針嫩薄者可用大針障浮者去烏珠近下針之障沈者須遠下針腎若沈下針近撥之則其腎不牢腎若浮下針遠撥之則腎多破若婦人有妊娠及新產後有斯疾者未宜下針直候體立安平方可開之不爾則必有所損凡開內障及諸腎膜等必須候天氣清明仍靜處斷除喧亂安心定意方可行針隨眼左右宜向小眥頭下針隔鼻開眼者鼻碍於手下

針不妙令患人正面坐手捉醫人腰帶勿令放手先將
銳針挂穴令定使得穴道勿令轉動定呼吸氣五十息
徐徐進針勿令過重亦不可全輕初且須輕輕未入即
須稍重針頭或偏即有損傷血則隨針出即不可止亦
不得重手按之恐血更多可輕輕裏之又須緩氣徐徐
用力逼之血即自止若血不止即見大傷則待血凝塞
針孔則合也可依舊法用藥將息轉針不過子午若針
覺緊急者則是入膜若放平猶滑及未得全入若已入

了其眼覺痛若痛且住歇少時漸漸進之臨過膜痛即更甚方便用意針過待痛稍定即可倒針向瞳人齊用平撥之向下不得絕重手也離瞳人微近開眼便見物既見物便合眼緩緩抽針出了停五十息久開得明朗見物即以綿封之依法將息勿失度稍失其宜即醫暈却上準前開亦得若撥後有動靜隨狀止之若有痛處以手隨處掐之即定若大痛不定即以火熨之凡欲下針預向人說勿恐下手疾人驚惡嘔吐亦須藥止痛以

大黃木香等為末以醋漿水和如泥作餅子搗之即定
或吐不定含白梅咽津仍預先含之吐逆盛即難止凡
諸藥須預備擬不可臨時闕也痛久不可忍即見損也
開眼後綿封七日喫豉粥仰臥不得轉動側臥常須人
看不可離人勿高聲叫喚大小便緩扶起勿令患人用
力及不得洗面避風將息七日後開封若見物猶白色
或如霜雪蓋是眼嫩故也亦未可全除封看物即可時
時一開若看物甚即睛疼必有所損二七日後方可除

封有物狀如衣帶飛蟲懸針之動水輪未定喫藥漸漸
自己三七日外眼或痒無慮也凡開時患人不得太飽
亦無令飢也既開見物或有痛處隨左右針之及掐捻
左右督脉顙顙風府等穴若針痕痛二三日即自定也
一月內不用洗面恐水入針孔即有損也宜以綿漬鹽
湯微微拭之七日內不得喫飯恐入口動牙關應著水
輪故須喫粥及軟爛之物夫治眼不論障翳及諸雜狀
候之眼皆不得當風看日及喜怒房事五辛酒麪炙烤

毒物並宜斷之唯須寬緩性情慎護調攝即無不差也

若縱恣乖違觸犯禁忌則自貽其咎矣

龍木論云針內障眼法歌曰內

障由來十六般學醫人子審須看分明一一知形狀下針方可得安然若將針法同圓腎誤損神光取差難冷熱先用虛與實調和四體待全安不然氣悶違將息嘔逆勞神腎却翻効眩震頭皆未得多驚先服鎮心丸丸求涼藥銀膏等用意臨時休後看老腎細針初撥嫩針形不可一般般病虛新產還娠月下手應知將息難不雨不風兼吉日清齋三日在針前安心定意行醫道念佛親姻莫雜喧患者向明盤膝坐捉師腰帶待心安針者但行賢哲行惻隱之情實善緣有血莫驚須住手裏封如舊再開看忽然驚振腎重下服藥三旬見朗然七日解封須見物花生水動莫他言還睛丸散堅心服百日分明復舊根針內障後法歌曰內障金針有了時

醫師言語要深知綿包黑豆如毯子眼上安排吊係之
頭安豆枕須安穩仰臥三朝莫厭遲臥後忽然微有痛
頭風牽動莫他疑或針或烙依經法痛極仍前火熨之
擬備白梅含咽汁吐來仰臥却從伊起則恐因遭努損
雖然稀有也須知七朝豉粥溫溫服震著牙關事不宜
大小便時須緩緩無令自起與扶持高聲叫言多驚動
睛輪驚動見雪飛如此忌必三十日漸行出外認親知
狂心莫憶陰陽事夫婦分牀百日期一月不須臨洗面
針痕須妨濕微微五辛酒麪
周年斷服藥平除病本基

緣風內障此眼初患之

時頭旋額角偏痛連臉骨及鼻頰骨痛眼內痛澀見花
或因惡心欲吐或因吐逆後便令一眼先患後相牽損
目前花生或紅或黑為肝肺受勞致令然也切宜服鈴

羊角飲子還睛丸兼鍼治諸血眉骨血脉令住疾勢也

歌曰初患頭旋偏腦額痒角相牽是緣風眼睜連鼻時痛悶澀生花黑白紅肝臟只因先患左肺家右眼作先鋒續後相牽俱總患緣他脉帶氣相通風勞入肺肝家壅濕熱潛流倒腎宮祕澀大腸猶自可每覺心煩土築胃多是有時加吐逆風痰積聚在心中羚羊湯藥須當服還睛丸散成其功頻針眉骨兼諸穴能令病本住行蹤忌鐵昇脉多出血恐因此後轉昏
烏風内障此
朦童子開張三曜絕效藥名醫更謾逢

眼初患之時不疼不痛漸漸昏沈如不患眼人相似先從一眼起後乃相牽俱損瞳子端然不開不大惟小不覩三光此是臟氣不和光明倒退眼帶障開經三五年

內昏氣結成腎如白青色不辨人物以後相牽俱損瞳人微小鍼之無效惟宜服藥補治五臟令住病勢宜服

決明丸補肝湯立效

歌曰都因但痺不頭疼漸漸昏朦似物瞞沒腎恰如昏不患烏風根本

更何言有花藏府虛勞是無即肝家氣壅之兩種既知虛與實分明用藥補和時治之先服涼藥飲空腹宜吞磁石丸食後補肝須早治瞳人未小即能痊襄陽年老還相似醫者披尋細意看目絕三光應不救瞳人乾定是為難

黑風內障此眼初患之時頭旋額角偏痛連眼

瞼骨及鼻頰骨時時亦痛兼眼內痛澀有黑花來往還從一眼先患以後相牽俱損亦因腎臟虛勞房室不節

致令為黑風內障不宜鍼撥切宜服藥將息鍼治諸穴

脉宜服羚羊角飲子補腎丸立效

歌曰黑暗形候緣風同眼府推尋別有蹤

黑即腎家來作禍緣風本自肺中攻欲知何藥能為療也要羚羊瘕病宗將息亦針除赤脉澀即輕輕鑱臉中忌房勞作啼嗔恨恣意之流切莫從腫子開張三曜絕明醫拱手謾相逢

青風內障此眼

初患之時微有痛澀頭旋腦痛或眼先見有花或無花瞳人不開不大漸漸昏暗或因勞倦漸加昏重宜令將

息便須眼藥終久結為內障不宜鍼撥皆因五臟風勞

所作致令然也宜服羚羊角湯還睛散即瘥

歌曰曾無痒痛本原

形一眼先昏後得明瞳人端然如不患青風便是此元
因初時微有頭旋悶或見花生又不生忽思勞倦加昏
暗知爾還應自失驚服藥更須將息到莫遣風勞更發
萌還服羚羊湯與散還睛鎮墜自相應頭摩膏藥勤作
力免使雙眸失却明患者無
知違法度已時還道是前生

又方

日精月華光明膏 治能開一切內障善治腎膜遮睛
及攀睛努肉不日掃除無問年久日深或一目兩目
俱患但能見人影者悉可去之如雲開而見日

好琥珀

一錢五
分別研

馬牙硝

飛過二
錢五分

銅綠

一錢
五分

真膽礬

一錢五
分別研
硼砂
一錢五
分別研
沒藥
四兩
別研
乳香
三錢
別研
青鹽
一錢

五
分
南硼砂
硃砂
各一錢
輕粉
一錢
別研
麝香
五分
別研
片

腦
五
分
防風
一錢
天花粉
五
分
前藥各研候後藥成膏

却下

黃連
四錢
研
當歸
一兩
核碾
訶子
一對
去
石決明
二兩
去
核細研

石膏
一兩
用臘
八
大鵝梨
二十个
槌碎
猪胰
俱用
草夾

細去
筋膜
爐甘石
四兩
童便浸
黃丹
一兩
用臘
雪浸

右先用首五味浸三日却用大砂鍋一口藥水再添

滿七分熬重綿濾過至四五碗却將鵝梨猪胰二味入內又熬至三碗再用濾過入鍋下爐甘黃丹同熬至二碗又濾過却下牙硝等十二味不住手用槐柳條攪勻後成膏如前濾淨入瓶內却入麝香片腦琥珀十分攪勻用油紙重封放冷水浸三日然後旋取膏入瓶內以銅筋點眼良

陽起石丸 治肝腎久虛眼目昏暗漸成內障

陽起石

一兩酒煮半日
細研水飛過

烏犀角屑

三分
防風
一分
去

羚羊角屑

分三

石決明

一兩搗研水飛過

麥門冬

一兩去心焙

真

珠

末

虎睛

一對酒浸一宿炙

甘菊花

川升麻

空青

葳蕤

細辛

車前子

蔓荊子

人參

去蘆頭

芎

窮赤芍藥

青柏子

槐子

炒

黃芩

蕤仁

湯浸

去赤皮

前胡

去蘆頭

決明子

漢防己

黃連

去須

茺蔚

子枳實

炒

川大黃

炒

甘草

炙已上各五錢

右為末令勻煉蜜和擣三十杵丸如梧桐子大每于食後用麥門冬湯下三十丸

乳香當歸散

治內障傷風寒攀睛瘀肉多年眼中倒

睫拳毛

鳳凰臺

當歸

薄荷

荊芥穗

藁本

穀精

草

石膏

煨

末藥

研

兔絲

淘去砂酒蒸

白葛根

蔓荊

子 苦丁香

漢防己

川芎

赤小豆

乳香

研

百節菖蒲

去毛炒

香白芷

自然銅

火煨醋淬七次研

火

龍爪

鬱金

各一錢

雄黃

研

定風子

細辛

各一錢五分

右為細末每日三次早午臥鼻內嚙之

麥門冬丸 治內障并久患者

熟地黃 麥門冬 車前子

右等分旋研煉蜜丸如梧桐子大每服二三十丸酒下屢效 一方不用酒服下其法三藥皆羅搗細和合再加盧甘石真竒方也大全集

退賢散

出秘方秘

治目內賢障或瘡疹後餘毒不散

真蛤粉

別研細

穀精草

生令為末各一兩

右同一處拌勻每服二錢同生豬肝一片三指大批

開摻藥在上捲定再用麻線扎之濃米泔一盞煮肝
熟為度取出於冷食後臨臥細嚼却用原煮肝米泔
送下忌一切毒物如齋素只用白柿同煎前藥冷乾
去藥食白柿孫盈仲云凡患瘡疹不可食雞鴨子心
生腎膜錢季華之女年數歲瘡疹兩眼皆生腎只服
此藥各退白膜三重瞳子方療

密蒙花散

出危氏方

治十六般內障多年昏暗及近日不

明淚出眩爛並皆治之

蜜蒙花

二兩

羚羊角

水煮剉炒乾

人參

覆盆子

蟾蜍

醋浸

地膚子

甘草

枸杞子

各一兩

羌蔚子

荊實

子

菊花

槐花

各五錢

右為末每服二錢食後用飯飲調下

甘菊散

出聖惠方

治肝臟風毒上衝眼目始則昏暗久成

內障

甘菊花

人參

去蘆

石膏

決明子

各一兩

旋復花

防風

去蘆

羚羊角屑

車前子

黃芩

杏仁

湯浸去皮

尖雙人麩
炒微黃

川升麻

三分

甘草

一分炙
赤剉

右為粗散每服三錢以水一盞入生薑半片煎至六分去滓食後溫服忌炙煨熱麵

羚羊角丸

出聖
惠方

治緣風障肝肺風熱壅滯見紅白黑

花頭額偏疼漸漸昏暗不見物者

方見本門目
見黑花類

磁石丸

出聖
惠方

治眼因患後起早元氣虛弱目無腎視

昏暗欲成内障

磁石

二兩燒醋淬七遍
杵細研水飛過

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿
去皮炙令乾
兔

絲二兩酒浸三日熟乾地黃一兩石斛一兩巴戟一兩

五味子

五錢

補骨脂

一兩

木香

五錢

桂心

五錢

遠志

一兩

甘草

五錢

右為末研藥令勻煉蜜和擣三百杵丸如梧桐子大

每於食前溫酒下三十九一方有茯神無遠志石斛

神仙碧丹 治內障點之

當歸

末藥

各二錢

血竭

片腦

硼砂

麝香

白丁香

各一錢

馬牙硝

南乳香

各五分

黃連

三錢

銅綠

二兩五錢為衣

右為末熬黃膏子為丸如雞頭大每用新汲水半盞
于瓷盒子內浸常用每一丸可洗四十日大病不過
一月小病半月冷淚三月見效

羚羊角散

出聖惠方

治烏風內障昏暗不見物

羚羊角屑

一兩

防風

去蘆頭

芎藭

赤芍藥

黃芩

甘菊花

細辛

枳殼

麩炒黃

黃連

石膏

一兩

甘草

五錢炙
赤剉

右搗粗羅為散每服三錢以水一鍾煎至六分食後

溫服

補腎丸

出聖惠方

治眼昏暗瞳人不明成黑風內障

磁石

二兩燒醋淬七遍
搗研細水飛過

兔絲子

一兩酒浸三日
暴乾別搗為末五

味子

細辛

澤瀉

薯蕷

車前子

各一兩

熟乾

地黃

羌蔚子

覆盆子

肉蓯蓉

酒浸一宿刮
去皮炙乾各

一兩
五錢

右搗羅為末煉蜜和搗五百杵丸如梧桐子大每於

空心及晚食前以溫水下二十丸

防風散

出龍木論

治圓內障

荒蔚子

防風

桔梗

五味子

知母

各二兩黑

參

川大黃

細辛

芒硝

車前子

黃芩

各一兩

兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

還睛丸

治水腎內障

人參

桔梗

黃芩

去黑心

乾地黄

生者焙各一兩

防風

荒蔚子 車前子 知母 焙各二兩 細辛 去苗葉 五味子

各二兩 黑參 五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

石決明丸 治滑內障

石決明 車前子 防風 知母 各二兩焙 荒蔚子

五味子 細辛 去苗葉 人參 茯苓 黃芩 去心 大黃

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大食前茶下十丸

葳蕤散 治肝風內障瞳人雖在昏暗漸不見物狀如

青盲

葳蕤 蔓荊子 元參 羌活 芎藭 枳殼

麩炒

微黃去瓢 各三分 羚羊角屑 一兩 甘菊花 五錢 蕤人 五錢湯浸去皮尖

甘草

五錢炙微赤判

右搗羅為散每服四錢以水一鍾入竹葉二十七片

煎至六分去滓每於食後溫服

通明散 治風內障黑水凝腎針後恐絕三光

栢子仁

二兩

防風

一兩五錢
去蘆頭

車前子

二兩

荒蔚子

前

胡

去蘆頭

人參

去蘆頭

白茯苓

蔓荊子

黃耆

剉各一兩

甘草

五錢炙
微赤剉

右為粗散每服二錢以水一鍾煎至六分去滓每於

食後及臨臥溫服

鎮肝丸

治驚振內障

石決明

別研

細辛

乾山藥

荒蔚子

人參

車

前子

栢子仁

茯苓

各一兩

防風

一兩五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食後茶下十九方
用溫水下二十九加至三十九

石決明丸 治眼烏風內障

車前子

一兩

細辛

一兩

桔梗

二兩

人參

二兩

石決明

一兩

細研水

飛過

羌蔚

二兩

防風

一兩

去蘆頭

白茯苓

一兩

薯蕷

一兩

兩

右為末煉蜜和搗三二百杵如梧桐子大每於空心
及晚食前以鹽湯下二十九

曾青膏

治風內障消翳明目及除青盲胎赤風爛

曾青細研 決明子 麤人湯浸去赤皮 乾薑炮裂 黃連去須

各一兩 黃芩 黃蘗剉各三分 車前子五錢 蜜二斤

右搗碎入蜜拌和於銅器中盛以油單密封勿漏氣於五斗飯中蒸米熟為度以新綿絞取汁如此二度每度換綿入銅瓶中盛入曾青攪令勻以蠟紙封七日方用每點以銅筯取藥內背中每日不退早晚點之

還睛散 治風內障驚振針後

車前子

人參

去蘆頭

桔梗

去蘆頭

防風

去

芎藭

羌蔚子

甘菊花

各一兩

熟乾地黄

二兩

右為粗散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後及臨臥溫服之

蘆薈丸 治眼內障針開後宜服還睛明目

蘆薈

人參

去蘆頭

細辛

乾牛膽

細研各五錢

羚羊角

屑

二兩

栢子仁

羌蔚子

車前子

青葙子

各一兩

右為末入牛膽研令勻煉蜜和搗三五百杵丸如梧

桐子大每於空心以鹽湯下三十丸

墜腎丸 治眼內障針開後

石決明

一兩搗細
研水飛過

甘菊花

人參

去蘆頭

地膚子

各一

兩五錢

細辛

五錢

熟乾地黄

兩二

五味子

一兩五錢

兔肝

一具炙乾

防風

二兩去蘆

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以鹽湯下二十九丸漸加至三十丸

還睛散 治澀腎內障

桔梗 五味子 羌蔚子 黑參 防風 黃芩

各一
兩 知母 車前子 細辛 各二

右為末以水一盞散一錢煎五分食後去滓溫服

決明散

出龍木論

治浮瞤內障

石決明

剉洗

人參

茯苓

去黑皮

大黃

車前子

各一兩

細辛

一兩

防風

羌蔚

桔梗

各二兩

右為末每服食後米飲調下一錢

還睛丸

出龍木論

治橫腎內障

人參 黑參 石決明 防風 車前子 五味

子 黃芩

各一兩

細辛

乾地黄

各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十九

七寶膏

出龍木論

治混睛外障

真珠

水晶

貝齒

各一兩

琥珀

石決明

各三兩

空

青

馬腦

龍腦

各五錢

右為末研令極細勻水五升石器內煎至一升去滓
蜜半兩和煎為膏每至夜臥臨時點之早晨不點

羚羊角散

出聖惠方

治眼浮花散漸昏朦成青風內障

羚羊角屑

人參

去蘆頭

羌活

元參

地骨皮

車前子

防風

去蘆頭

決明子

一兩

右為細散每服二錢食後煎竹葉湯調下

補肝湯

出龍木論

治滑腎內障

人參

茯苓

白者去黑皮

黑參

黃芩

去黑心各一兩

防風

去叉

知母

桔梗

羌蔚子

各二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分夜食後去滓溫

服

決明散方

出聖惠方

治眼內障針後宜服墜腎

石決明

搗細研水飛過

車前子

人參

去蘆頭

甘菊花

槐

子

熟乾地黄

各一兩

荒蔚子

防風

去蘆頭各二兩

右為細散每服食後以粥飲調下二錢臨臥時服

七寶丸

出龍木論

治澀腎內障

龍腦

一錢人參

一兩真珠

五錢琥珀

三分

青魚膽

熊膽

各一

兩

荒蔚子

四兩

石決明

二兩別搗羅細研

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十丸

墜腎丸

出龍木論

治浮腎內障

石決明

刮末細辛

各一兩去苗葉

知母

焙

生乾地黄

焙

防風

各二兩去叉

兔肝

一具炙乾

五味子

人參

各二兩五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

空青丸

出龍木論

治沈腎內障

方見本門目生膚腎類

還睛散

出龍木論

治棗花腎內障

人參

茯苓

車前子

黑參

防風

各一兩

羌蔚

花

知母

各二兩

黃芩

去皮一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓溫服

通明散

治黑水凝翳內障

人參

車前子

桔梗

菟蔚

芎藭

各一兩

防風

細辛

各一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓溫服

涼肝散

出龍木論

治混睛外障

川大黃

桔梗

各五錢

黃芩

羚羊角

黑參

人

參 茯苓

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓溫服

點眼硃砂煎

出聖惠方

治外障針開後經年熱澀痛及治

一切眼障暈

硃砂

細研

琥珀

細研

黃蘗

生

黃連

末

麝香

湯浸去赤皮

細研

各一分

黃丹

一錢

馬牙硝

五錢

研細

右同研如粉後用白蜜三兩煎濾去滓入諸藥更研令勻入一竹筒盛內重湯煮之半日著柳枝子時時

攪之後色如紫以綿再濾過每日四度以銅筋取少許點之

七寶湯

一名羚羊角散

治眼內障針開後宜服補肝安心消

醫明目

方見本門內障眼針後用藥類

羚羊角飲子

出龍木論

治圓翳內障

羚羊角

三兩鎊

細辛

去苗葉

知母

焙

車前子

人參

黃芩

各二兩去黑心

防風

二兩五錢去叉

右搗羅為細末以水一盞散一錢煎至五分食後去

淳溫服之

羚羊角飲子

出龍木論

治沈腎內障

羚羊角

鎊

防風

去

羌蔚子

各二兩

車前子

黑參

黃芩

各一兩去黑心

大黃

五錢錯炒

右為末以水一鍾散一錢煎至五分空心去滓溫服

此藥久服大效

七寶湯

出龍木論

治橫腎內障

方見本門內障眼鍼後用藥類

墜腎丸

出龍木論

治偃月腎內障

青羊膽

青魚膽

鯉魚膽

各七箇

熊膽

一分牛膽

五錢

麝香

少許

石決明

一兩

右為末麵糊為丸如梧桐子大空心茶下十丸

退賢丸

出龍木論

治混睛外障

白芷

細辛

五味子

枳殼

各一兩去瓢麩炒

牡蠣

荒蔚子

各二兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心米飲下十丸

蔓荊子湯

一名人參補胃湯

治勞後飲食不節內障眼病此

方效驗如神

黃耆

人參

各一兩

炙甘草

八錢

蔓荊子

二錢五分

黃柏

酒浸

拌炒
四偏

白芍藥

各三錢

右咬咀每服三五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱服
臨臥三五服後兩目廣大視物如童時惟覺兩脚踏
地不知高下蓋冬天多服升陽藥也病減佳服候五
七日再服此藥春間服乃良藥也

治眼遠視不明常有黑花欲成內障方

青牛膽

一枚

黃牛膽

汁一合

熊膽

一分

鯉魚膽

三分

烏雞膽

五牛黃

五錢
研細

右先將諸膽相和次入牛黃調攪令勻入銀器內以文武火熬成膏以瓷器內盛之每於食後以溫酒調下五分

人參丸

出聖惠方

治內障用針後肝虛眼昏明目

人參

去蘆頭

決明子

各一兩五錢

黃耆

剉二兩

枳殼

一兩麩炒微黃

去瓢覆盆子

兔絲子

二兩酒浸三日曝乾別搗為末

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每於空心以溫酒下三十丸服之

補肝湯

出龍木論

治散腎內障兼治目風眼寒

細辛

防風

羌蔚子

各二兩

五味子

桔梗

各一兩

黑參

一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分去滓空心溫服

通明散

出龍木論

治偃月腎內障

人參

防風

黃芩

各二兩

茯苓

五錢

羌蔚子

二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分夜食後溫服

墜腎散

出龍木論

治白腎黃心內障

石決明

茺蔚子 車前子

防風

各二兩

人參

甘菊花

各三兩

右為末食後粥飲調下

五退散

出龍木論

治內障眼

龍退

蛇皮

蟬退

鳳退

烏雞卵殼

佛退

蠶紙

人退

男子退髮

右等分不拘多少一處同燒作灰研為細末每服一

錢熟猪肝喫不拘時候日進三服一方用羊肝喫

羅漢應夢丸

一名觀音夢授方

治內障及因病赤眼食鹹物

而得者

又名羊肝丸出經驗良方

夜明砂

淨

當歸

蟬蛻

洗

木賊

去節各等分

右為末用羯羊子肝四兩水煮爛搗如泥入前藥為

丸如梧桐子大食後溫熟水下五十丸百日眼如故

昔有徐道享奉母至孝患眼食蟹遂內障暗誦般若

經至市得錢米以奉母忽夕夢羅漢告此方眼復明

空青丸

出聖惠方

治黑風內障肝腎風虛上焦客熱昏暗

不見物

空青

燒過細研

甘菊花

羚羊角屑

各五錢

赤茯苓

二兩覆

盆子

枸杞子

決明子

楮實

水淘去浮者微炒各一兩

羌

活

人參

去蘆頭

槐子

微炒

車前子

元參

各三分

右為末入空青研令勻煉蜜和丸如梧桐子大每於

食後以竹葉湯下三十丸

還睛丸

出龍木論

治緣風內障兼治肝臟虛血弱不能止

羌蔚子 防風各二兩 人參 決明子 車前子

芎藭 細辛各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十九

羚羊角飲子出龍木論 治黑風內障

羚羊角 羌活 黑參 細辛 桔梗 黃芩

柴胡各一兩 車前子 羌蔚子各一兩 防風二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

羚羊角飲子出龍木論 治緣風內障

羚羊角 防風 知母 人參 茯苓 黑參

桔梗

各二兩

細辛

黃芩

車前子

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

決明丸

出龍木論

治烏風內障

石決明

防風

人參

車前子

細辛

茺蔚

子

乾山藥

茯苓

桔梗

各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大食前茶下十九

補肝湯

出龍木論

治烏風內障

芍藥

一兩細辛

桔梗

車前子

人參

茯苓

各一

兩羌活

防風

各二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食前去滓溫服

還睛散

出龍木論

治青風內障

人參

車前子

地骨皮

茯苓

各二兩

細辛

防

風

芎藭

羌活

各三兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

補肝散

出龍木論

治肝風目暗內障

羚羊角 防風各二兩 羌活 車前子 人參 茯苓

苓 細辛 黑參 黃芩各三兩五錢

右為末每服食後米飲調下一錢

山藥丸

出龍木論

治證同前

乾山藥 乾地黃 人參 茯苓 防風 澤瀉

各一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下十丸

補腎丸

出龍木論

治黑風內障

方見本門將變內障眼類

羚羊角飲

出龍木論

治青風外障

方見本門將變內障眼類

白附子散

出永類鈴方

發散初起黑花昏蒙內障

荊芥穗

四兩

菊花

防風

木賊

去節各三兩

白蒺藜

炒去

刺一兩

粉草

炙一兩

蒼朮

製

人參

羌活

右咬咀每三錢煎食後服

還睛散

出濟生方

治散醫內障

人參

茯苓

細辛

五味子

桔梗

防風

車前子

各一兩

右為末以水一錢散一錢煎至五分夜食後去滓溫服

復明散

出東垣
蘭室方

治內障

黃芪

一錢
五分

蒼朮

柴胡

一錢

連翹

一錢

甘草

炙一錢

當歸

身

一錢

生地黄

一錢

橘皮

五分

川芎

五分

青皮

三分

右件如麻豆大都作一服水二大錢煎去滓稍熱服

之食後忌酒醋溫麪辛熱大料物之類

沖和養胃湯

一名圓腎內
障升麻湯

治內障眼得之脾胃元氣

衰弱心火與三焦俱盛遠出外飲食失節形體勞役
心不得休息故生此疾服之神效出試效方

柴胡

七錢

羌活

一兩五錢

防風

五錢

炙甘草

一兩五錢

當歸

酒製

白

朮

白芍藥

各六錢

乾薑

一錢

五味子

二錢

人參

葛根

各二兩

黃芪

一兩五錢

升麻

二兩

白茯苓

三錢

右咬咀每服五六錢水三觔煎至二觔入黃芪黃連
三錢同煎至一觔食後去滓稍熱服

瀉熱黃連湯

出試效方

黃芩

酒製
炒

黃連

酒製

草龍膽

酒製

生地黃

酒製各
三兩

升麻

五
分
柴胡

一兩

右件咬咀每服二錢將先煎前藥水內入瀉熱黃連湯再煎至一觔去滓於日午飯間熱服之午後服之則陽道不行臨臥休服反助陰故也

益氣聰明湯

出試
效方

治飲食不節勞役形體脾胃不足致

內障耳或鳴聾目暗視物不能令目廣大久服無內障耳鳴聾之患又令精神過倍元氣自益身輕體健

耳目聰明

黃芪

甘草

各五錢

芍藥

一錢

黃蘗

一錢酒製
剉炒黃

人參

五錢

升麻

葛根

各三錢

蔓荊子

一錢五分

右咬咀每服稱三錢水二觔煎至一觔去滓熱服臨臥近五更再煎服之得腫更妙如煩悶或有熱漸加黃蘗春夏加之盛暑夏月倍之若此味多則不效如脾胃虛者去之有熱者少用之如舊有熱麻木或熱上壅頭目三兩服之後其熱皆除治老人腰已下沈

重疼痛如神此藥久服令人上重乃有精神兩足輕
浮不知高下若此空心服之或少加黃蘗輕浮自減
若治倒睫去黃蘗芍藥忌烟火醋物

羌活退腎丸

一名地黃丸

治內障右眼小眇青白腎大眇

頭微白腎腦痛瞳子散大上熱燥大便澀滯小便如
常遇天熱暖處頭痛睛脹能食日沒後天陰則暗昏
此證亦可服滋陰地黃丸

出試效方

熟地黃

錢一防已

二錢酒製

生地黃

酒製

當歸身

酒製

黃蘗

各五錢
酒製

芍藥

一兩
三錢

川芎

知母

三錢
酒製

丹參

五錢

羌蔚

子

五錢

羌活

三錢

牡丹皮

三錢

寒泉石

一錢
生丹

柴胡

五錢

或
三錢

黑附子

一錢
炮

右為末煉蜜丸如小棗豆大空心每服五七十九白

湯送下如消食未盡候飢時服之忌言隨後以食物

壓之東垣秘藏云醫在背加葛根升麻醫小加柴胡

羌活是也

圓明膏

出試
效方

治內障生翳及瞳子散大皆勞心過度

因飲食失節之所致也此方收睛圓明

柴胡

五錢

麻黃

微搗五錢去節

當歸身

三錢

生地黄

黃連

五錢

甘草

二錢

訶子皮

二錢濕紙裹煨

右先以水二碗熬麻黃至一碗掠去沫外六味各咬咀如豆大節去沫稱勻入在內同熬入在水中不散去沫入蜜少許再熬勤如常點之

蒼朮丸

出朱氏集驗方

治內障

右以蒼朮半斤切作片黑豆一升用水二碗煮乾焙

研為末糊丸每服三十九丸空心鹽湯下

外障眼論

夫膜入冰輪外障此眼初患之時肝臟積熱虛勞年多
發歇作時睛上有瘡可後使生障腎漸入冰輪因大腸
壅滯致使然也此宜服退熱飲子鉤割熨烙兼宜補虛

鎮心丸

歌曰黑上生瘡可服痕續生努肉漸相侵時多
長覆過痕了因此名膜入冰輪雖即三光微可

見烏珠底下碧氣氣忍痛孟
浪強鉤割遂使雙眸轉更昏

腎玉浮瞞外障此眼初

患之時或疼痛此是毒風上衝入腦積熱在乎肝膈之

上致令眼内有翳如玉色相似遮瞞瞳人如此疾狀並

不宜割熨針烙但只宜服退翳散立效

歌曰黑上浮雲如玉色還因瘡

可後留痕枉施摩翳膏和散拱手神醫玄妙門服藥去風兼治熱還睛丸散是其因燒香供養依櫬柱覓取從來清淨根

旋螺尖起外障此眼初患之時忽然疼痛作時

由積熱壅毒留在於肺間切補治恐損眼也宜服搜風

湯瀉肝飲子宣揚立效

歌曰眼前生翳處尖起似旋螺切治雖依舊根源更奈何時時

疼痛發風起未消磨湯藥雖勤服醇濃莫妄過但將丸與散解毒定由他失熱消除後明如秋日河

眼黃膜

上衝外障此眼初患之時疼痛發歇作時赤澀淚出漸

生外膜直覆黑睛難辨人物皆因脾臟風冷胃家極熱

切宜鑱鉤熨烙然後宜點青膏服通胃瀉脾湯

歌曰黑暗從下

生黃膜脾胃寒風熱與并痛疼發時多計較門冬犀角便能微或鑱或點依經法若信邪巫不用爭更過燒灸無效後再來求療為施行

赤膜下垂外障此眼初患之時忽然赤

澀淚下疼痒摩隱瞳人黑睛漸生翳障赤膜下垂直覆

珠睛有此障蔽如雲霞之色如此狀切宜鑱洗出血熨

烙然後點清涼散服羚羊角飲子即瘥

歌曰黑睛從上赤來遮臟腑元

知受熱邪客氣交肝愁內壅睛輪被覆似雲霞上臉還令瘀氣盡洗鑱除去血方佳消停又點清涼散請醫臨

時減
與加

風牽臉出外障此眼初患之時乍好乍惡發歇

無時多因淚出不止蓋因胃受風氣肝膈積熱雍毒在
眼眥之間致使眼皮翻出切宜鑱洗散去瘀肉熨烙三
五度然後服黃耆湯用摩風膏摩之臉內塗白臉膏瘥

歌曰一般風熱入雙眸此疾何緣障其除肝臟毒風翻
出臉腎因傳送入烏珠若是臉翻還易療毒風入黑即
難除銅篦輕熨摩風
藥白臉為膏臉內塗
雞冠蜆肉外障此眼初患之時

皆因脾胃積熱肝臟受風漸漸入眼致生翳膜如雞蜆
肉或青或赤此疾宜令鉤割鑱洗熨烙然後宜服抽風

湯散熱荒蔚子丸即瘥

歌曰瞼中生翳是雞冠翳者先須翻出看蜆內或青又赤黑不

嫌割烙始能痊要除風熱憑湯散曾用曾青點病原

雞冠凝睛外障此眼初患

之時忽然痒痛淚出五輪脹起皆硬難以回轉難辨人

物宜針引血脉以摩風膏塗之此疾皆因五臟熱壅衝

上腦中風毒入眼致使然也宜服瀉肝湯抽風散

歌曰五輪

目硬難為轉鵲眼凝睛是本神欲知根源何所起腦中風熱臟中蒸先將針引開風壅藥壓塗抹血脉行風熱

直須從內洩除瞋戒行即時平

瞳人乾缺外障此眼初患之時忽因

疼痛發歇作時難忍夜不得臥遂即瞳人乾缺或上下

或東西長不圓正雖辨三光久後俱損大人多患其瞳

人或白或黑不定白者腦脂下流為患黑者膽氣腎臟

俱勞肝氣為患宜服瀉膽散鎮肝丸補腎散立效

歌曰瞳人

乾缺水全無或黑或白作形模白即腦脂來閉塞黑色
其中本自虛此狀必須疼痛後膽家風熱作堪虞瀉膽
鎮肝丸與散更宜
補腎散資扶 輓轡轉關外障此眼初患之時皆因

膈中壅毒肝臟極熱風熱入腦致令眼帶弔起瞳睛難

以回轉不辨人物有胎患者乃不可治也若初患急須

療之宜服天門冬飲子瀉肝散

歌曰上臉藏中下臉藏回還不肯定中央轉關

恰似轉轆轤轉皆因風熱腦中傷初
患之時宜急療門冬飲子瀉肝當

方

補腎丸

出龍木論

治黑腎如珠外障

人參 茯苓 五味子 細辛 肉桂 桔梗

各一

兩 乾山藥

栢子仁

各二兩五錢

地黃

一兩五錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心茶下每服十九

芫蔚散

出龍木論

治冰瑕腎深外障

芫蔚子

防風

各二兩

黑參

細辛

大黃

枳殼

知母

芒硝

各一兩

芍藥

一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

人參湯

出龍木論

治冰瑕腎深外障

人參 茯苓 桔梗 五味子 大黃 黑參

車前子

各一兩

黃芩

知母

各一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

補勞人參丸

出龍木論

治逆順生腎外障

人參 乾地黄 茯苓 桔梗 乾山藥 防風

木香 細辛 桂心 各一兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心茶下十九

烏犀丸

出龍木論

治兩瞼粘睛外障兼努肉

烏犀 茯苓 芍藥 細辛 黑參 人參 各一兩

乾山藥 羌活 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下一十九一方

用米飲下

曾青膏

出龍木論

治眼黃膜上衝外障

曾青 秦皮 細辛 白芷 乳頭香 乾腦

各一兩

各一分

黃連

三分

訶子

木香

各五錢

右為末研令勻細以水二碗浸三日後煎至一碗以重綿濾滓後更入蜜四兩同煎為膏盛在磁瓶中封之勿令洩氣用之點眼立效

黃耆湯

出龍木論

治風牽瞼出外障

黃耆

羌蔚子

各二兩

防風

一兩五錢

人參

茯苓

川

大黃 地骨皮

黃芩

各一兩

甘草

五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

退熱飲子

出龍木論

治膜入冰輪外障

黃芩

防風

羌蔚子

桔梗

各二兩

大黃

五味

子

黑參

細辛

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

鎮心丸

出龍木論

治證同前

石決明

人參

茯苓

大黃

各一兩

遠志

乾山

藥

細辛

防風

各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十九

搜風湯

出龍木論

治旋螺尖起外障

防風

五味子

天門冬

大黃

桔梗

各一兩

細

辛

芍藥

各一兩五錢

羌蔚子

二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

通脾瀉胃湯

出龍木論

治眼黃膜上衝外障

麥門冬

羌蔚子

各二兩

防風

黑參

天門冬

黃芩

各一兩五錢

大黃

知母

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

羚羊角飲子

出龍木論

治眼赤膜下垂外障

羚羊角

一兩五錢

羌蔚子

黃耆各二兩

黃芩 天門冬

黑參

知母

桔梗

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

大效紫金膏

出聖濟總錄

治外障退翳膜癰氣毒上衝眼

疼赤腫或眼眦痒痛時多熱淚昏澀

槐嫩枝牙三十條

中春采嫩枝子亦好

鉛丹

細研飛過三分

黃連

緊實

者七條各
二寸半長
輕粉三錢
烏魚骨去皮為末二錢
乳香明淨者一錢
龍

腦少許
白蜜四兩

右先將槐枝并黃連用雪水或井水一碗半入銀石器內慢火熬及半盞去滓次入乳香又熬之如茶腳許將蜜別熬去滓放冷入煎膏及去沫攪勻再熬如金漆色瓷器收每用少許點眼

退賢散出龍木論
治賢玉色浮滿外障

石決明 車前子 大黃 黃芩 細辛 各一錢 防

風二芍藥

兩一兩
五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

瀉肝飲子

出龍
木論

治旋螺尖起外障

大黃 車前子 細辛 芒硝 黃芩 桔梗

知母

各一
兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

灸肝散

出聖濟
總錄

治外障肉腎膜遮不明

石決明

洗

穀精草

洗各
四兩

皁角

炙去皮
子一分

甘草

炙剉
二兩

木

賊判黃芩

去心各五兩

蒼朮

米泔浸七日切焙半斤

右為散每用須猪肝一葉去筋膜切數縫摻藥末五錢於縫內仍摻鹽一錢合定用家園中柳枝三四條閣起慢火炙香熟早晨空心冷喫盡喫冷飯一匙壓之仍于三里穴灸三五七壯後有淚下為驗七日腎膜必退每旦用新水漱口

青金丸

出聖濟總錄

治風毒攻眼成外障翳膜

銅青

真靛人者

去皮尖與銅青共浸三日去水研

生犀角

淨水磨紙水飛過

石決明

淨水磨漚乾一錢

龍腦

研

白丁香

水研去滓漚乾

海螵蛸

水飛過

各五分

右將銅青與麝人先研如糊次入白丁香研次四味研細用好墨研濃汁於淨器中熟為丸如菉豆大每用人乳汁化開點眼未用者常以龍腦養于瓷中

青涼煎

出龍木論

治赤膜下垂外障

龍腦

粉

馬牙硝

秦皮

各一兩

防風

黃連

各三分

右先將四味為末以水二碗浸藥二日後煎二大盞

濾去滓更煎三五沸內磁合子內盛之別入龍腦

粉攪勻點眼

水照丸

一名神仙照水膏

治眼外障醫

出龍木論

黃蠟

片切一兩

蛇退

燒灰研一分

鉛丹

水飛研一兩

水銀

一分丹砂

研少許

雞卵殼

鳥雞始生須完全去裏面清並殼研如粉一枚

右先將黃蠟溶汁投諸藥用柳枝同攪成膏候不見

水銀星即丸豌豆大作餅子以丹砂為依仍置用砂

未養之每用一餅臨臥安在眼內至天明開眼遺放水盞內上有翳膜再洗以丹砂末衣過養之其水盞先置于頭邊一方無丹砂

石決明散

出經驗良方

治眼生外障不拘男女大小並皆

治之

石決明

火煨

薄荷葉

各一兩

蒺藜子

炒去刺

荊芥穗

各二兩

人參

五錢蜜炙

右于地上上火毒研為末食後砂糖冷水調服

白劍膏

出龍木論

治風牽瞼出外障

白劍

白芷

白芨

各一兩

突厥白

一兩五錢

右為末用牛酥五兩煎為膏早晨塗在眼瞼內夜半

塗亦得

復明膏

出儒明事親書

治外障

白丁香

臘月收者尤妙稱八錢水飛過

揀黃連

一兩 防風

去蘆錯碎一兩

新

柳枝

長一寸者三

右以新水一升半雪水尤妙春秋兩三時冬月一宿

藥于銀石器內熬至六分去滓另用蜜一斤蜜陀僧研末三字入蜜攪勻另熬以無漆匙撩點下蜜中急攪候沸湯定一人旋又攪藥汁都下在內入蜜攪勻再熬三兩沸俟色稍變用生綿三兩濾滓盛器內點眼如常一方每藥半合用片腦一麥粒大亦可

精明散

出龍木論一名金子散

治外障退翳膜風毒上攻眼疼

赤腫瞼皆痒爛時多熱淚

方見本門一切雜治類

猪膽方

出龍木論

治外障眼

以猪膽一枚用銀鈔或瓷鈔煎成膏入水腦粒如
黍米大點入眼中覺腎輕又將猪膽白膜皮陰乾
合作小繩如釵股大小止用一頭燒灰待冷點腎
數日後腎退雙目如舊此治腎重者尤良不過三
五度好

羚羊角飲子

出龍木論

治黑腎如珠外障

羚羊角 五味子 細辛 大黃 知母 芒硝

各一兩
防風二兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

細辛散

出龍木論

治因他患後生腎外障

細辛

羌蔚

各二兩

黑參

黃芩

桔梗

大黃

各一兩

兩車前子

一兩

右為末水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

知母飲子

出龍木論

治逆順生腎外障

知母

羌蔚

車前子

各二兩

桔梗

大黃

五

味子

黃芩

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

排風散

出龍木論

治兩臉黏睛外障

天麻

桔梗

防風

二兩

五味子

烏蛇

細辛

芍藥

乾蝎

右為末食後空心米飲調下一錢

抽風散

出龍木論

治雞蜆肉外障

防風

二兩

大黃

桔梗

細辛

各一兩

黃芩

黑參

芒硝

車前子

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

荒蔚子丸

出龍木論

治證同前

荒蔚子

人參

乾山藥

各三兩

茯苓

大黃

黃

芩

黑參

石決明

各一兩

乾地黃

一兩五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十丸

摩風膏

出龍木論

治鵲眼凝睛外障

黃耆

細辛

當歸

杏仁

各一兩

防風

松脂

黃蠟

各二兩

白芷

一兩五錢

小麻油

四兩五錢

右為末煎成塗之

抽風散

出龍木論

治證同前

石決明

車前子

茯苓

五味子

各一兩

人參

細辛

知母

各一兩五錢

右為末食後米飲調下一錢

瀉膈湯

出龍木論

治證同前

防風

大黃

羌蔚子

黃芩

黑參

桔梗

芒硝

各一兩

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

瀉膽散

出龍木論

治腫人乾缺外障

荒蔚子

黃耆

各一兩五錢

麥門冬

地骨皮

黑參

黃芩

知母

各一兩

右為細末以水一盞散一錢煎至五分去滓食後溫

服

鎮肝丸

出龍木論

治證同前

乾山藥

二兩

人參

茯苓

車前子

石決明

五

味子

細辛

各一兩
五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十九

補腎散

出龍
木論

治證同前

澤瀉

二兩

乾地黄

人參

各一兩
五錢

茯苓

乾山藥

菖蒲

各一
兩

右為末每服一錢空心米飲調下

天門冬飲子

出龍
木論

治轆轤轉關外障

天門冬

羌蔚子

知母

各二
兩

五味子

防風

各一

兩
人參 茯苓

羌活 各一兩
五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

麥門冬湯

出龍木論一
名瀉肝散

治證同前

方見本門血
灌腫人類

透明丸

治外障熱腫臟腑實熱不通

苦參

四兩

黃蘗

二兩
去皮

寒水石

二兩

芎藭

一兩
洗

升麻

一兩

山

梔子仁

一兩

右為末麵糊為丸青黛為衣食後麥門冬湯下

硃砂煎

治外頑瘡醫赤脉

明硃砂

研細水飛

朋砂

麝人

去內外心

海螵蛸

去殼腦子

右研令細如粉無暇入少麝香同研于點障白厚重加馬牙硝少許同研

將變內障眼

論

夫眼疾始于淺浮久而弗圖變為內障非一端也龍木論內障皆有其漸蓋從一眼先患後乃相牽俱損是肝腎氣虛風邪熱毒上攻眼目氣血衰微久則為害但不疼不痛久無眵淚目視如輕烟薄霧或見垂絲或見蠅

翅飛蚊其初無足慮及其成是慢不知省今以將變內

障者叙之蓋圖難于易之意也

龍木論云五風毒此眼初患之時亦是臟府虛

勞肝風為本或因一眼先患兼腦熱相侵致令眼目失明初覺即須急藥宜服除風湯通明丸補肝丸即效詩曰烏絲青風及黑黃甚嗟宿世有災殃後有腦脂流結白真如肉色又如霜醫人不知將針撥醫胎非明却自傷雷頭風變內障此眼初患之時頭面多受熱毒風衝頭旋猶如熱病相似俗號為頭風或嘔逆惡心年多衝入內失明或從一眼先患大小不定後乃俱損宜服瀉肝丸磁石丸效詩曰俗號雷風熱毒風年多衝入眼睛中瞳人或大及或小坐對三光黑不紅腦熱流脂來結白醫師不了便針通雖然醫隆風猶在須把根株洗一空瀉肝磁石丸俱服依法何難立見功

方

補肝丸 治眼昏暗將變內障

杏仁 羌蔚子 青箱子 枸杞子 五味子

茯苓皮去 決明子各一兩 乾地黄三兩 兔絲子 山芋

車前子 地骨皮 栢子仁 大黃 細辛去苗 甘

草炙 人參 黃芩去心 黃連去須 防風各一兩五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九食後米飲

下臥時加三十丸

秦皮散 治眼昏暈多歷年月恐變為內障

秦皮

去皮

新葇子

車前子

大藍實

防風

去義

決

明子

炒各二兩

瞿麥穗

升麻

枳殼

去穰炒

黃連

去須

前

胡

去蘆頭

梔子仁

各一兩

黃蘗

去皮炙

羚羊角

薏實

各一兩

兩

右為末每服三錢溫水湯調下食後臨卧服

空青丸

治眼目昏暗漸變內障

空青

五錢別研

荒蔚子

五味子

炒

細辛

去苗

蔓荊實

栢子仁

別研

蒺藜子

去角炒

枸杞子

人參

去蘆

防風

石龍芮

各一兩

決明子

炒

兔絲子

酒浸別搗為末二兩

右為末入空青研勻煉蜜丸如梧桐子大食後以竹

葉湯下服三十丸日三

菊花丸

治眼昏暗漸成內障

菊花

二兩

黃連

去須各一兩五錢

車前子

羌蔚子

青箱子

地膚子

決明子

炒

薪冥子

苦參

防風

去心

黃芩

去心

蕤人

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸食後米飲
下晚又服

黃耆丸 治肝虛勞及膀胱久積冷目眩見花不明漸成內障

黃耆

劉

白茯苓

去黑皮

石斛

去根各二兩

鹿茸

去毛酥炙一兩五錢

五味子

炒二兩

防風

去叉

生乾地黄

焙

牡丹皮

酸棗

仁

覆盆子

各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸空心酒下

加三十丸

瀉肝湯 治雷頭風變內障

防風

羌蔚子

各二兩

五味子

細辛

黃芩

桔

梗

大黃

芒硝

各一兩

車前子

一兩五錢

右為末以水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

除風湯 治五風變內障

羚羊角

車前子

各二兩

芍藥

人參

茯苓

大

黃

黃芩

芒硝

各一兩

右為末水一盞散一錢煎至五分食後去滓溫服

通明補腎丸 治證同前

車前子 石決明 桔梗 芍藥 各一兩 細辛 一大兩

黃一分 荒蔚子 生乾地黄 各二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十九

石決明丸 治眼昏暗漸成內障

石決明 一兩 槐子 熟乾地黄 一兩 陽起石 一兩 酒煮

飛磁石 一兩 五錢 燒醋淬 兔絲子 一兩 酒浸三日 暴乾別研 桂

心 五錢 肉蓯蓉 一兩 酒浸一宿 刮去皮炙乾

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大食前鹽湯下二十九

補腎丸 治目暗浮花恐變成黑風內障

澤瀉

去苗葉

細辛

去苗葉各一兩

五味子

炒一兩

熟地黄

焙 芫

蔚子

各二兩

山芋

一兩五錢一作乾山藥

兔絲子

酒浸焙別搗一兩

右除兔絲子別搗外搗羅為末再和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十九空心鹽湯下

磁石丸 治雷頭風變內障

磁石

燒醋浸
三遍

五味子

炒

牡丹

乾薑

黑參

各一
兩

附子

炮製去皮
臍五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大食前茶下十九

羚羊角飲

治眼漸暗及靨浮花恐變成青風內障

羚羊角

地骨皮

洗

人參

羌活

去蘆

元參

車前

子

各一
兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後臨

臥溫服

瀉肺飲 治肝虛省目恐變成內障

防風

去

黃芩

去

桔梗

剉

大黃

剉

芍藥

各一

兩

右粗擣篩每服三錢水一盞半煎一盞入芒硝半錢
去滓放溫食後臨臥服

內障鍼後用藥

論

大弩肉攀睛淫膚垂臉之類皆為外障審其輕重則有
服食點洗之劑鉤割熨烙之法以外去者蓋其勢微淺
所以除治在皮膚之表爾內障之症異于是有不痒不

痛者虛實特未定也有冰澀浮沈素花偃月之腎淺深固不一也亦有清明無腎若未疾苦者與未患又相似也是以治內障每重於腎藥必候之歲月其腎成熟乃用鍼撥或一用而愈若覩青天之快方且對閉以持安寧而又服藥以攻其內所以掃除根本復其自然而已世之專治者甚多不可盛舉大抵以龍木為模法龍木內障二十有二可以鍼者一十有二皆言鍼後用其湯丸則知內障非鍼無以取效且治眼至于鍼誠出于不

得已豈輕用妄投耶鍼法具載別叙今姑以鍼後用藥次第列之于左

方

防風湯 治內障圓翳針後及澀翳

防風

去義

羌蔚子

五味子

知母

焙

桔梗

炒

車前

子

元參

大黃

剉炒

細辛

去苗

黃芩

去心

各一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至六分去滓溫服

食後臨臥日二次

決明散 治內障浮翳或如眼花或若銀釘浮淺透外

方見本門
膜遮障類

七寶散 治內障冰翳如冰凍堅結睛上以鍼撥取後

及散翳

石決明

搗研
二兩

人參

羌蔚子

各一兩

琥珀

搗研
三分

龍腦

研一
分

真珠

搗研

熊膽

各五錢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服十五丸食前茶下

加至二十九

七寶湯 治內障橫瞖瞳人中起如劍脊鍼後

羚羊角 銹 犀角 銹 胡黃連 車前子 石決明 刮洗

搗 甘草 炙各五錢 丹砂 研一兩

右除丹砂決明外搗粗篩每服三錢以水一盞煎至七分去滓入丹砂末五分決明末一字再兩沸食後溫服

人參湯 一名還晴湯 治內障散瞖狀如酥點清爛以針撥

如涎散亂針後又驚振內障眼 方見本門目血失瞳人類

四膽丸

治內障偃月翳如凝脂一邊厚一邊薄狀如

偃月鉞後及內障棠花翳

象膽

五錢

鯉魚膽

七枚

熊膽

一分

牛膽

麝香

研一錢

石決

明

搗研

右為末麵糊丸如梧桐子大每服十九空心茶下

普濟方卷七十九